

## Neuroangion anestesiapotilaat

Riitta Rautio 20.3.2015

Neuroangion yleisimmät toimenpiteet ovat:

-elektiivinen coilaus

-SAV-coilaus

-AVM-embolisaatio

-carotisstenttaus

-aivoaltimotrombektomia

Aneurysmapotilas hoidetaan yleisanestesiassa. AVM potilas, carotisstenttaus ja trombektomiapotilas voivat olla sedaatiassa tai yleisanestesiassa.

Toimenpiteen aikana voi tulla esim. aneurysman perforaatio, parenkymivuoto tai suonen tukkeutuminen. Näistä viitteenä on esim. verenpaineen äkillinen muutos. Tällaisissa hätätilanteissa on endovaskulaarisen hoidon rinnalla oleellisen tärkeä osa asiansa osaavalla anestesiaväellä.

Aivoaltimotrombektomiapotilaat eroavat muista neuroangion potilaista siinä, että he voivat jo toimenpiteeseen tultaessa olla epävakaita mm. tajunnantason, ko-operaation ja vitaalitoimintojen osalta. Trombektomiapotilaan hoidon ennusteessa oleellista on nopea toiminta, joten jokaisen hoitoon osallistuvan tulisi tehdä parhaansa, jotta saavutetaan mahdollisimman viiveetön endovaskulaarisen hoidon aloitus. Tämä koskee yhtäläillä ensiapupoliklinikan, anestesiayksikön ja radiologisen yksikön henkilökuntaa.